

avec 2 capsules de phéromones

## pyrales du buis 2 pièges de surveillance pour

### 2 monitoringvallen voor buxusmotten mét 2 feromoongapsules



178\*178\*255



Ecologische producten hebben  
de toekomst voor zich! Dankzij  
intensief onderzoek combineren  
dese producten efficiëntie met  
een minimale druk op het milieu.

### 2 MONITORINGVALLEN VOOR BUXUSMOTTEN MÉT 2 FEROMOONCAPSULES

Voor het detecteren van mannelijke buxusmotten

#### HET WERKINGSPRINCIPLE VAN DEZE VALLEN

De vallen werken met feromonen. Mannelijke buxusmotten worden aangetrokken door de feromonen en denken dat ze een vrouwelijke buxusmot benaderen. Ze komen de val binnen en kunnen niet meer ontsnappen.

#### WAT DOET DEZE VAL?

- Voor alle duidelijkheid, deze val doet niets aan de rupsen die reeds aanwezig zijn op de buxusen. Maar wel wordt de aanwezigheid van buxusmotten zeer snel vastgesteld.
- Door met deze val te werken, worden plagen van de buxusmot in een vroeg stadium opgemerkt en weet u dat de buxusplanten kort nadien kunnen aangevallen worden door rupsen. Belangrijk is vanaf dan goed de buxusplanten te controleren en zodra kleine rupsjes opgemerkt worden, de inzet van een insecticide te overwegen, zoals BSI Omni-Insect



#### WAT U MOET WETEN OVER DE BUXUSMOT

Gemiddeld zijn er 3 generaties per jaar. De eerste aantasting vindt meestal al plaats in april, ten gevolge van rupsen die overwinterden. Nadien zijn er gemiddeld 3 vluchten van buxusmotten (mei/juni, juli/augustus, september/oktober) met tussenin nog 2 pieken van rupsaantasting. Zodra u buxusmotten vangt met de vallen, weet u dat er de weken nadien rupsen te verwachten zijn. Controleer uw buxusplanten dan 2 à 3 keer per week, want de schade door rupsen kan op enkele dagen tijd enorm zijn.

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

#### GEBRUIKSAANWIJZING

Bevat: 2 vallen en 2 feromoongapsules. **Opgelat:** de capsules lijken leeg,  
maar werken perfect. **De feromonen zijn wel degelijk aanwezig, ook al zijn  
ze onzichtbaar!** De capsules nooit openen!

- 1 Vul de vallen met ca. 5 cm water en voeg enkele druppels afwasmiddel toe.
- 2 Monteer de vallen volgens het schema.
- 3 Haal de feromoongapsule uit het aluzakje, raak ze zo weinig mogelijk met de handen aan, plaatst ze in de feromoongapsulehouder, en plaats de feromoongapsulehouder vervolgens in de val.
- 4 Hang ze op in de buurt van buxusplanten. 1 val trekt motten aan in een ruimte van ca. 200 m<sup>2</sup>.



#### VOORZORGSAMSTREGELEN

Buitengerek van kinderen bewaren. Bewaar het feromon in de originele verpakking, op een koele en donkere plaats.

Een product van / un produit de:  
Bio Services International, Jagershoek 13, B-8570 Vichte  
Tel. +32 (0)56 77 24 34 • www.bsi-products.



5 420046 641909 >

178\*178\*255



Ecologische producten hebben  
de toekomst voor zich! Dankzij  
intensief onderzoek combineren  
dese producten efficiëntie met  
een minimale druk op het milieu.



### 2 pièges de surveillance pour pyrales du buis avec 2 capsules de phéromones



### 2 PIÈGES DE SURVEILLANCE POUR PYRALES DU BUIS AVEC 2 CAPSULES DE PHÉROMONES

Pour détecter les mâles de la pyrale du buis

#### LE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES PIÈGES

Les pièges fonctionnent à l'aide de phéromones. Les mâles de la pyrale du buis sont attirés par les phéromones et pensent être en présence d'une femelle. Ils entrent dans le piège et ne peuvent plus s'en sortir.

#### QUEL EST L'EFFET DU PIÈGE?

► Soyez clairs, ces pièges n'ont aucun effet sur les Chenilles déjà présentes dans les buis. Mais on constate très vite la présence de la pyrale du buis.

► En utilisant ces pièges, le fléau de la pyrale du buis peut être constaté à un stade précoce et vous savez en même temps, que les buis seront grignotés par les Chenilles peu de temps après. Il est important, de bien inspecter les buis à partir de ce moment et de considérer l'utilisation d'un insecticide dès que des petites Chenilles ont été constatées, par exemple BSI Omni-Insect.



#### CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LA PYRALE DU BUIS

En moyenne, il y a 3 générations par an. Le plus souvent, la première infestation se manifeste déjà au mois d'avril, suite aux Chenilles qui ont hiberné. Après, il y a en moyenne 3 vols de pyrales du buis (mai/juin, juillet/août, septembre/octobre) avec entre-temps 2 nouvelles attaques de Chenilles. Dès que vous attrapez des pyrales du buis dans les pièges, vous pouvez être sûr qu'il y aura des Chenilles les semaines qui suivent. Contrôlez vos buis 2 à 3 fois par semaine à partir de ce moment, car les dégâts occasionnés par les Chenilles peuvent être énormes en quelques jours seulement.

J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D

#### MODE D'EMPLOI

Contient: 2 pièges et 2 capsules de phéromones. **Attention: les capsules semblent être vides, mais fonctionnent parfaitement! Les phéromones sont bien présentes, mais sont invisibles. Ne jamais ouvrir les capsules!**

- 1 Remplissez de + 5 cm d'eau, ajoutez-y quelques gouttes de liquide vaisselle.
- 2 Montez les pièges selon le schéma.
- 3 Enlevez la capsule de phéromones du sachet en aluminium, touchez-la le moins possible avec les mains, mettez-la dans le porte-capsule et mettez ensuite le porte-capsule dans le piège.
- 4 Suspendez les pièges à proximité des buis. La portée d'un piège est de 200 m<sup>2</sup> environ.



#### MESURES DE PRÉCAUTION

Conserver hors de la portée des enfants. Conserver les phéromones dans l'emballage d'origine, dans un endroit frais et à l'abri de la lumière.