


Teelt	Tegen (ziekte)	Dosis, aantal toepassingen	Toepassingsstadium
Buxus	Bladvlekkenziekte (Cylindrocladium)	5 ml/10 l water , 1-4 toepassingen	Preventief of vanaf eerste symptomen
Sierplanten (niet voor consumptie)	Bladvlekkenziekte, witziekte, roest	5 ml/10 l water , 1-4 toepassingen	Preventief of vanaf eerste symptomen
	Schurft	1 ml/10 l water , 1-4 toepassingen met een tijdsinterval van 10 dagen	Preventief of curatief (uiterlijk 96u na aantasting)

Pulvériser jusqu'à la limite du point de ruissellement

ERSTE HULP MAATREGENEN. Bij het inwinnen van medisch advies, verpakking of etiket ter beschikking houden. NA INSLUKEN: de medische spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk het ANTIGIFTICHT BREDER 1000 een arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze makkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFTICHT BREDER 1000 een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangegetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. **Tel. ANTIGIFTICHT: 070 245 245.**



FUNGAZOL (Lees de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik)

Breedwerkend fungicide tegen verschillende schimmelsziekten (bladvlekkenziekte, witziekte, roest, schurff) bij onder andere sierplanten zoals buxus en rozen. Ook geschikt voor de bestrijding van de gevreesde bladvlekkenziekte bij buxus. Voorkomende en genezende werking. Bij curatief gebruik: toepassen zo snel mogelijk na het verschijnen van de eerste symptomen.

Dosis: 1-5 ml/10 l water, sproeien tot net niet afdruipten met een drukspuit, max. 4 toepassingen

Na de behandeling de percelen pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Lees de bijsluiter voor meer informatie over dosering, toepassingswijze en aantal toepassingen in functie van de teelt en de te bestrijden ziekte.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Om resten te vermijden, dient men zo nauwkeurig mogelijk te berekenen hoeveel spuitvloeistof moet klaargemaakt worden in functie van de te behandelen oppervlakte. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien: houd 10 m afstand van oppervlaktewateren.

GEVARENAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebaarsten huid veroorzaken. Bij het innemen van medisch advies, verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. NA INSLIKKEN: omringd met een ANTIDOTICENTRUM of een arts raadplegen. De mond openhouden en de persoon ernaar wijzen om de GEGEVOORDECHTIDIGHEID van de water gebruikende een aantal minuten. Contacten verwijderen indien mogelijk. Bijlenen spoelen. Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

FUNGICIDE – Amateurgebruik – Toel.nr.: T181G/P
EC – emulsijsaag concentraat

Werkzame stof: 250 g/l difeniconazool
Co-formulanten: solvent-nafte (aardolie), zwaar aromatisch (index 649-424-00-3)
Toel. houder: Bio Services Int.
Jagershoek 13, B-8570 Vichte (BELGIUM).
Tel. +32 (0) 56 77 24 34 - www.bsi-products.com



3510617vpFuZo25ml 64062

Lotnummer en exp. datum: zie fles /
N° du lot et date d'exp.: voir bouteille

