

Fongicide pour pommes de terre

Lotnr. / N° du lot: zie verpakking / voir emballage
Exp. Date:

PREMIERS SOINS - Inhalation: maintenir la victime calmée et l'emmener à l'air frais. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage (emballage: rincer la bouche. Faire boire un peu d'eau. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Contact avec la peau: rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Projection dans les yeux: rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porter de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage. Rincer l'œil contaminé. Rincer l'œil non contaminé en place, pour le traitement symptomatique. - Contacter le Centre Antipoison: 070/245 100, pour le traitement ultérieur en milieu hospitalier.

BELPATAT

Produit contre le mildiou de la pomme de terre (*Phytophthora infestans*), communément appelé 'maladie de la pomme de terre':

- Action préventive, action longue durée
- Protège les feuilles, nouvelles feuilles en cas de croissance rapide, tiges et tubercules
- Résistant au lessivage 1 h après l'application
- Produit liquide, diluer et appliquer avec un pulvérisateur

L'application est à réaliser par pulvérisation. Les feuilles doivent seulement être mouillées et pas pulvérisées à refus. Traiter sur végétation sèche. Mesures de réduction du risque: respecter une distance de 10 m par rapport aux étendues d'eau. Délai avant récolte: 3 jours. Pour plus d'informations, voir la notice ci-jointe. De façon à éviter tout surplus de traitement après application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer en fonction de la superficie à traiter.

Risques particuliers

Toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets
néfastes à long terme. Conseils
de prudence: tenir hors de portée
des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas manger, boire ou fumer
en manipulant ce produit. Porter des gants de protection, des vêtements
de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Recueillir le
produit répandu. Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte
des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale,
régionale, nationale et/ou internationale.



Conditions particulières d'application: "Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement". Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux points d'eau (voir mesures anti-dérive). Ne pas pénétrer dans des cultures / surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

Emballages vides et surplus de traitement

Vider complètement l'emballage et le rincer 3 fois en secouant énergiquement. Verser l'eau de rinçage dans le pulvérisateur. L'emballage vide ne peut en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins. Traiter l'emballage vide conformément aux dispositions régionales. Limiter les surplus de traitement en ne préparant que le volume de solution nécessaire en fonction de la superficie à traiter. Diluer les surplus 10 fois et les appliquer sur la partie déjà traitée. Ne jamais verser le surplus de traitement dans les égouts. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fossés avec le produit ou l'emballage vide.

N° d'aut. : 1059G/P. Contient: 250 g / l Mandipropamide. Formulation:
Suspension concentrée SC. Dét. d'aut.: Bio Services Int., Jagershoek 13, B-8570 Vichte.

72 ml e
voor / pour **120 l**
spuitoplossing / de solution
6 x 200 m²




GEBRUIK

(Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing)

DOSIS: 6 ml / 10 l water voor 100 m².



1 - 6 toepassingen met een interval van 7 dagen indien de ziekte reeds aanwezig is of het risico van aantasting hoog is. 1 - 6 toepassingen met een interval van minstens 2 weken indien het risico van aantasting laag is of de ziekte afwezig is.



(Lire les instructions avant l'emploi)
Dose: 6 ml / 10 l d'eau pour 100 m².

APPLICATION

1 - 6 applications à intervalle de / jours
si la maladie est déjà présente ou si le
risque d'attaque est élevé. 1 - 6 applica-
tions à intervalle d'au moins 2 semaines
ou plus si le risque d'attaque est faible
ou la maladie absente.

EERSTE HULP MAATREGELEN

LEZEN EN HET WATERSPOEL Het spoelen van de mond is een van de frisse lussen brengen. Ze symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: spoel de mond. Geef wat water te drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking. Huid: spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderdelen vreterrijnige kledij en schoenen. Ze symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Ogen: spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel weg van het niet-aangestane oog. Bij contactlazen: zo makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Opmerken voor de arts - Prehospital: symptomatische behandeling. - Contacteer het Antigifcentrum voor verdere behandeling in het hospital. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigifcentrum, 070/245.245.

BELPATAT

Product tegen de aardappelziekte (*Phytophthora infestans*), ook aardappelplaag genoemd:

- Preventieve werking, lange werksduur
- Beschermt loof, nieuw gevormd loof bij snelle groei, stengels en knollen
- Regenvast vanaf 1 uur na behandeling
- Vloeibaar product, verdunnen en toepassen met drukspuit

Gebruik voor de toepassing een drukspuit. De bladeren bevochtigen, niet tot afdrippen toe. Behandelen op een droog gewas. Risico beperkende maatregelen: 10 m afstand houden van oppervlaktewaters. Veiligheidsstermijn voor oogst: 3 dagen. Voor verdere informatie, lees de bijsluiter. Om resten te vermijden dient men zo nauwkeurig mogelijk te berekenen hoeveel (spuit) vloeistof moet klaargemaakt worden of hoeveel men nodig heeft in functie van de te behandelen oppervlakte.

Bijsondere gevaren: giftig voor

Bijzondere gevaren: giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen: Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Bijzondere toepassingvoorwaarden Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een welbepaalde bufferzone rond oppervlaktewater niet sproeien (zie diffirenduceerde maatregelen). Na de behandeling de percelen / oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitwolkstof is opgedroogd.

Lege verpakking en behandelingsoverschotten

De verpakking volledig leegmaken en 3 keer spoelen en telkens krachtig schudden. Het speelwater moet in het spuittoestel gegoten worden. In geen geval mag de lege verpakking opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden. De lege, gereinigde verpakking moet volgens de regionale voorschriften afgevoerd worden. De overschotten moeten bergend worden door enkel het noodzakelijke volume in functie van de te behandelen oppervlakte voor te bereiden. Overschotten 10 maal verdunnen en verspreiden over een reeds behandeld oppervlak. Behandelingsoverschotten nooit in de riolering gieten. Vijvers, waterlopen, beken en arachten noch met het middel, noch met de verpakking vervuilen.

Toel. nr. 1059G/P. Bevat: 250 g / l Mandipropamide. Formulatie: Suspensie concentraat SC.
Toelatingshouder: Bio Services Int., Jagershoek 13, B-8570 Vichte.



BELPATAT - Toel. Nr. / N° d'aut.: 1059G/P
Antigifcentrum / Centre Antipoisons: tel 070/245 245



1857A