



Dossiernummer: 35601

Datum: 30/10/2024

VERGUNNING VOOR PARALLELHANDEL VAN EEN GEWASBESCHERMINGSMIDDEL

Betreft : verlenging + aanpassing product van oorsprong

Handelsbenaming :

OMNI INSECT

Vergunningsnummer :

1185G/P

Gebruikerscategorie : **NIET-PROFESSIONEEL**

Vergunningshouder :

BIO SERVICES INTERNATIONAL

Naamloze vennootschap
Deerlijkstraat 57
8570 ANZEGEM
België

Aard van het middel : **Insecticide**

Formuleringstype : **EW (Emulsie, olie in water)**

Referentieproduct : **9868G/B**

Gewaarborgd gehalte van de werkzame stof(fen), synergist(en) en beschermstof(fen) :

- **deltamethrin: 15 g/l (werkzame stof)**

Deze vergunning is geldig van **31/10/2024** tot en met **15/08/2027** en vervangt elke eventuele



voorafgaande vergunning voor dit product.

De bijzondere voorwaarden voor de verlenging zijn de volgende: **indienen van een aanvraag tot verlenging ten laatste 2 maanden voor vervaldatum.**

Toegekende punten voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage (in toepassing van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten) : **4,9.**

Deze vergunning wordt verleend in toepassing van:

- de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

voor de parallelhandel van het product met de specificaties vermeld in dit document. De lidstaat van oorsprong van dit product en het toelatingsnummer ervan in de lidstaat van oorsprong moeten overeenstemmen met de gegevens vermeld in de aanvraag.

De houder van de vergunning voor parallelhandel moet de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten van DGAPF van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in toepassing van artikel 34 van het KB van 28 februari 1994 zonder uitstel en schriftelijk op de hoogte brengen van de invoer, de opslagplaats en de omvang van elke ingevoerde partij, lotnummer en productiedatum inbegrepen. Deze moet gedurende 48 uur na de notificatie ter beschikking gehouden worden van de voornoemde Dienst.

Per lot moet ten minste één verzegelde en van het oorspronkelijk etiket voorziene verpakking gedurende 2 maanden ter plaatse ter beschikking van het FAVV gehouden worden.

Volgende regel is enkel van toepassing voor een vergunning op naam van een buitenlandse firma :
de vergunning is slechts geldig voor zover de namen en adressen van elke invoerder van dit product voorafgaandelijk meegedeeld worden aan de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten.



De staat kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen die zouden voorkomen door het gebruik van het product waarvoor deze vergunning is afgeleverd. Zij wordt toegekend onverminderd de schikkingen getroffen door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg betreffende de fabricage en het gebruik van giftige of schadelijke stoffen.



BIJLAGE

INDELING EN ETIKETTERING VAN HET PRODUCT

Onverminderd de bepalingen inzake indeling en/of etikettering van :

- de Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006;
- de Verordening (EU) nr. 547/2011 van de Commissie van 08 juni 2011 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de etiketteringsvoorschriften voor gewasbeschermingsmiddelen;
- het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik;

moeten de volgende vermeldingen op het etiket van het product vermeld worden:

Indeling en etikettering in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008

Signaalwoord :

- WAARSCHUWING

GHS-codes en gevarenpictogrammen :

- GHS02 : Ontvlambaar 
- GHS09 : Milieugevaarlijk 

Gevarenaanduidingen (H zinnen) :

- H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
- H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (P zinnen) :

- P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 : Buiten het bereik van kinderen houden.
- P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P273 : Voorkom lozing in het milieu.
- P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P501 : Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.



Aanvullende gevareninformatie (EUH zinnen) :

- EUH208 : Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en een mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
- EUH401 : Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Zinnen volgens Verordening (EG) nr. 1107/2009 of (EU) nr. 547/2011

Standaardzinnen voor veiligheidsadviezen (SP zinnen) :

- SP1 : Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
- SPa1 : Om resistentieopbouw te voorkomen moet u dit product afwisselen met producten met een ander werkingsmechanisme. De IRAC code voor het werkingsmechanisme van de werkzame stof van dit product is 3A.
- SPe3 : Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen).
- SPe8 : Gevaarlijk voor bijen en andere bestuivende insecten. Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken.
- SPo : Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.



GEBRUIKEN

De toepassingen waarvoor het product is toegelaten en de specifieke voorwaarden waaronder het product gebruikt mag worden :

rode biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: groentevliegen (*Anthomyiidae* / *Psilidae* /)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

wortelen (*Daucus carota*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

pastinaak (*Pastinaca sativa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus* var. *radicula*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)



Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

radijs (*Raphanus sativus* var. *radicula*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

schorseneer (*Scorzonera hispanica*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Wachttijd voor de oogst: 90 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1



Toepassingstechniek: bespuiting

koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

mierikswortel (*Armoracia rusticana*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



knoflook (*Allium sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

uien (droogge oogste) (*Allium cepa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum*/A. *cepa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sjalot (*Allium cepa* *Aggregatum* types)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tomaten (*Solanum lycopersicum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

aubergine / eierplant en pepino (*Solanum melongena* / *S. muricatum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

komkommer (*Cucumis sativus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².



Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

komkommer (*Cucumis sativus*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².



augurk (*Cucumis sativus*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

augurk (*Cucumis sativus*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

courgette / patisson (*Cucurbita pepo*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: besputing

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

courgette / patisson (*Cucurbita pepo*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

broccoli (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cymosa*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt



Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea* var. *botrytis* subvar. *cauliflora*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

spruitkool (*Brassica oleracea* var. *gemmifera*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sluitkool (witte, rode, kabuiskool, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea* var. *capitata*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)



Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (*Brassica oleracea* var. *gongylodes*)

Locatie van de behandeling: open lucht
Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt
Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)
Risicobeperkende maatregelen:
- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: bladmineerders (*Agromyzidae* / *Gracillariidae* / *Depressariidae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

veldsla (*Valerianella locusta*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

veldsla (*Valerianella locusta*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)



Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 14 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



slasoorten (*Lactuca sp.*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

witloofwortelteelt (*Cichorium intybus* var. *foliosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca vesicaria* subsp. *sativa*/Diplotaxis tenuifolia)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

rucola (*Eruca vesicaria* subsp. *sativa*/Diplotaxis tenuifolia)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)



Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: trips (*Thysanoptera*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting
Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

asperge (*Asparagus officinalis*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming
Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de oogst
Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden
Risicobeperkende maatregelen:
- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)
Aantal toepassingen: 1 tot 2
Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)
Toepassingstechniek: bespuiting



asperge (*Asparagus officinalis*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Toepassingsstadium: na de oogst

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

prei (*Allium porrum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting



snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens* var. *secalinum*)

Locatie van de behandeling: onder bescherming

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- Geen bufferzone ten opzichte van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens* var. *secalinum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Om gewasbeschadiging te voorkomen is het aangeraden een test te doen op enkele planten alvorens het volledige veld te behandelen.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3



Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

suikermaïs (*Zea mays subsp. saccharata*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 3 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

aardappelen (*Solanum tuberosum*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 2 toepassing(en)/teelt

Wachttijd voor de oogst: 7 dag(en)

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.



Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/10 l/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 2

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

sierplanten (*ornamentals*)

Locatie van de behandeling: open lucht

Gewastype: alle

Maximaal aantal toepassingen: 3 toepassing(en)/12 maanden

Risicobeperkende maatregelen:

- 10 m afstand houden van oppervlaktewater.

Waarschuwing(en):

- Het gebruik in sierplanten werd toegestaan op basis van proeven uitgevoerd met de volgende soort(en): *Rosa* spp.
- De soorten en variëteiten van siergewassen die kunnen worden behandeld, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de toelating/vergunning.

Ter bestrijding van: bladluizen (*Aphididae* / *Lachnidae* / *Callaphididae*)

Dosis: 8 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: witte vliegen (*Trialeurodes vaporariorum* / *Bemisia tabaci*)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipe)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².



Ter bestrijding van: rupsen (*Mamestra* / *Spodoptera* / *Autographa* / *Orthosia* / *Thaumetopoeidae* / *Agrotis* / *Noctua* / *Euxoa* / ...)

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².

Ter bestrijding van: kevers (adulten, larven) (*Coleoptera* (*Chrysomelidae* / *Halticini* / *Curculionidae* / ...))

Dosis: 5 ml/100 m² (tot afdruipen)

Aantal toepassingen: 1 tot 3

Minimum interval tussen twee toepassingen: 14 dag(en)

Toepassingstechniek: bespuiting

Opmerking: de vermelde dosis verdunnen naar 10-15 l/100m².



VERPAKKINGEN

Dit product mag alleen op de markt worden gebracht in de volgende verpakkingen :

Type : fles in kartonnen doos

Materiaal : HDPE

Volume : 0,06 l

Inhoud : 0.02 l

De verpakking bevat een maatbeker :

Beschrijving : **measuring beaker**

Volume min : **1 ml**

Volume max : **25 ml**

Gegradueerd : **ja**

Volume : 0,06 l

Inhoud : 0.05 l

De verpakking bevat een maatbeker :

Beschrijving : **measuring beaker**

Volume min : **1 ml**

Volume max : **25 ml**

Gegradueerd : **ja**

OMSCHRIJVING VAN DE TEELTEN

rode biet (kroten) (*Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva*) : alle variëteiten

wortelen (*Daucus carota*) : alle variëteiten

pastinaak (*Pastinaca sativa*) : alle variëteiten

radijs (*Raphanus sativus var. radicola*) : radijs met een overwegend rode of witte schil, weinig pikante smaak, alle variëteiten

rammenas en rettich (*Raphanus sativus*) : radijs met een overwegend rode, witte of zwarte schil, zeer pikante smaak, alle variëteiten (mierikswortel is niet inbegrepen)

schorseneer (*Scorzonera hispanica*) : alle variëteiten

koolraap (*Brassica napus subsp. rapifera*) : alle variëteiten

raap (stoppelraap, meiraap) (*Brassica rapa subsp. rapa*) : alle variëteiten

mierikswortel (*Armoracia rusticana*) : alle variëteiten

knoflook (*Allium sativum*) : alle variëteiten

uien (drooggeogste) (*Allium cepa*) : alle variëteiten, zowel gezaaid als geplant, die rijp geoogst worden

bosuien (lente-ui) (*Allium fistulosum / A. cepa*) : jong geoogste uien, alle variëteiten

sjalot (*Allium cepa Aggregatum types*) : alle variëteiten

tomaten (*Solanum lycopersicum*) : alle variëteiten, inbegrepen de kerstomaten

aubergine / eierplant en pepino (*Solanum melongena / S. muricatum*) : alle variëteiten

komkommer (*Cucumis sativus*) : alle variëteiten

augurk (*Cucumis sativus*) : alle variëteiten

courgette / patisson (*Cucurbita pepo*) : alle variëteiten van courgette en patisson die geoogst worden wanneer de schil nog eetbaar is en die volledig gegeten worden

broccoli (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cymosa*) : alle variëteiten

bloemkool (witte en groene) (*Brassica oleracea var. botrytis subvar. cauliflora*) : alle variëteiten

spruitkool (*Brassica oleracea var. gemmifera*) : alle variëteiten

sluitkool (witte, rode, kabuiskool, savooi- en spitskool) (*Brassica oleracea var. capitata*) : alle variëteiten

koolrabi (koolraap-boven-de-grond) (*Brassica oleracea var. gongylodes*) : alle variëteiten

tuinkers en andere kiemen en scheuten (*Lepidium sativum*) : alle variëteiten van scheutgroenten

veldsla (*Valerianella locusta*) : alle variëteiten



slasoorten (*Lactuca sp.*) : alle soorten en variëteiten

witloofwortelteelt (*Cichorium intybus var. foliosum*) : Voor de behandeling van het gewas op het veld; alle variëteiten voor de productie van witloof en roodlof.

rucola (*Eruca vesicaria subsp. sativa/Diplotaxis tenuifolia*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) (*Phaseolus vulgaris*) : alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden

groengeoogste erwten (met peul) (*Pisum sativum*) : alle variëteiten waarvan de peulen onrijp geoogst worden voor verwerking tot conserven, om in te vriezen of voor de verse markt

asperge (*Asparagus officinalis*) : alle variëteiten (productieveld: asperges op velden die in productie zijn, dus niet het 1ste of 2de jaarsgewas)

prei (*Allium porrum*) : Alle variëteiten. Let op: Het aantal toepassingen wordt uitgedrukt als een aantal per teelt. Dit moet beschouwd worden als het aantal toepassingen die één preiplant mag ontvangen, ongeacht de plaats waar dit plantje staat. Dus zaaibed en productieveld worden beschouwd als één teelt.

snijselder (consumptie bladeren) (*Apium graveolens var. secalinum*) : aromatische of medicinale plant, alle variëteiten

suikermaïs (*Zea mays subsp. saccharata*) : alle variëteiten

aardappelen (*Solanum tuberosum*) : behandeling van de teelt vanaf het planten tot aan de oogst van de aardappelen (primeur- en bewaaraardappelen)

sierplanten (*ornamentals*) : Alle soorten en variëteiten, niet bestemd voor consumptie. Middelen toegelaten in deze teelt mogen ook gebruikt worden voor de opkweek van fruitbomen en -heesters voor zover deze nog niet op hun definitieve plaats staan en de vruchten niet geoogst worden.