

the view of ready booklet

130 mm

ICBpharma Animal Health



Pesticidevrij, wateroplosbaar
concentraat met fysieke werking
tegen bloedluizen en andere insecten
voor de toepassing in kippenstallen,
in aanwezigheid van kuikens, kippen
en eieren.

Voorkomt en controleert plagen van:
• Rode bloedluizen (*Dermanyssus gallinae*),
• Piepschuimkever (*Alphitobius diaperinus*),
• Kalkpootmijten (*Cnemidocoptes mutans*),

En beschermt onrechtstreeks
tegen microbiologische besmettingen

FRONT
BOOKLETU
str

Produit concentré hydrosoluble
sans pesticide, avec actions physique,
contre les poux rouges et autres
insectes, et pour application dans
les élevages avicoles, en présence
de poulets, poules pondeuses et œufs.

Prévient et contrôle l'infestation des :
• Poux rouges (*Dermanyssus gallinae*),
• Petits ténébrions (*Alphitobius diaperinus*),
• Acariens de la galle des pattes
(*Cnemidocoptes mutans*),

Et protège indirectement contre
des infections microbiennes.

voor / pour 1000 m²

ectonet
TECHNOLOGY

Distributeur / Verdeleer: BSI Expert
Jagershoek 13, 8570 België / Belgique
+32 56 77 24 34



15 mm

115 mm

Lees voor gebruik altijd het etiket en de bijsluiter en respecteer alle gegeven instructies voor een veilige en doeltreffende toepassing.

ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING

Dergall® is een pesticidevrij, wateroplosbaar concentraat met fysieke werking: het product met een gepatenteerde formule vormt een drie-dimensionaal net rondom de ectoparasiet en eventueel aanwezige eitjes (Ecto Net Technology). Toepasbaar in de aanwezigheid van vogels en eieren. Het product is niet toxic en dringt de eieren en de kippen zelf niet binnen. Dergall® heeft naast een werking tegen frequent voorkomende bloedluizen, piepschuimkevers, en kalkpootmijten ook een interessante werking tegen overige kleine insecten, mijten,... en helpt dus plagen te voorkomen en bestrijden. Dergall® verbetert de algemene gezondheid van de vogels door het stressniveau en het risico op ziektes, veroorzaakt door ectoparasieten, te verminderen, en verhoogt de eiproductie. Dergall® bevat geen insecticide, is geur-en kleurloos, kan toegepast worden in aanwezigheid van vogels en eieren, en werkt meteen. Dankzij haar fysieke werking is er geen risico op resistentie.

GEVARENAANDUIDINGEN: veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

BEVAT: Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane.

VEILIGHEIDAANBEVELINGEN: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking stellen. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van nevel vermijden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minutenen, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **VERWIDDERING:** inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften. Antigifcentrum (BE) +32 (0)70 245 245; (G.D.-de Lux) +352 8002 5500; (France-Nancy) +33 383 22 50 50. **OPSLAG:** bewaren op een droge plaats tussen 0 °C - 30 °C. **HOUDBAARHEID:** 4 jaar na productiedatum. Dergall® tegen bloedluizen, mijten en piepschuimkever / Contre les poux rouges, les acariens et les ténébrions

WERKING / Méthode d'action: fysieke werking / action physique
BEVAT / Contient: Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane.
Inhoud / Contenu: 1 Liter / Litre

WAARBORG: wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor onvoldoende werking, schade of ongevallen voortkomende uit door ons niet gecontroleerde toepassing.

GARANTIE: nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour une efficacité insuffisante, des dégâts éventuels ou des accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous./voir emballage

REV-20203-1-0-4
Lotnr en productiedatum / N° de lot et date de production:
zie verpakking / voir emballage

Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et respectez toutes les instructions fournies pour une application sûre et efficace.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Dergall® est un concentré hydrosoluble sans pesticides avec action physique: le produit avec formule brevetée crée une structure tridimensionnelle autour de l'ectoparasite et des œufs éventuels (Ecto Net Technology). Applicable en présence de oiseaux et leurs œufs. Le produit est non toxique et ne pénètre pas dans les œufs et les poulets eux-mêmes. Dergall® a un effet contre les poux rouges, les acariens de la galle des pattes, et les petits ténébrions, mais a également un effet contre d'autres petits insectes, acariens, etc. et aide à prévenir des infestations parasitaires. Ce produit améliore la production d'œufs et la santé générale des oiseaux en diminuant le niveau de stress générée par des maladies causées par des ectoparasites. Dergall® est immédiatement efficace, ne contient pas d'insecticides, est inodore et incolore, et est applicable en présence d'oiseaux et d'œufs. Grâce à son effet physique, il n'y a aucun risque de résistance.

MENTIONS DE DANGER: provoque une grave irritation oculaire. Nociif par inhalation. Toxicité pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

CONTIENT: Polyalkyleneoxide modified heptamethyltrisiloxane.

CONSEILS DE PRUDENCE: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Eviter le rejet dans l'environnement. Éviter de déverser les brouillards/vapeurs. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **ÉLIMINATION:** éliminer le contenu et récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Centre Anti-Poisons (BE): +32 (0)70 245 245; (G.D.-de Lux) +352 8002 5500; (France-Nancy) +33 383 22 50 50. **STOCKAGE:** stocker dans un endroit sec entre 0 °C - 30 °C. **DURÉE DE CONSERVATION:** 4 ans à compter de la date de production.

WAARSCHUWING ATTENTION



UFI: 4801-C0SJ-G00G-MYA8



5 420046 644344

150 mm

130 mm



Pesticidevrij, wateroplosbaar
concentraat met fysieke werking
tegen bloedluizen en andere insecten
voor de toepassing in kippenstallen,
in aanwezigheid van kuikens, kippen
en eieren.

Voor komt en controleert plagen van:

- Rode bloedluizen (*Dermanyssus gallinae*),
- Piepschuimkever (*Alphitobius diaperinus*),
- Kalkpootmijten (*Cnemidocoptes mutans*),

En beschermt onrechtstreeks
tegen microbiologische besmettingen

**FRONT
BOOKLETU
str 1**

Produit concentré hydrosoluble
sans pesticide, avec actions physique,
contre les poux rouges et autres
insectes, et pour application dans
les élevages avicoles, en présence
de poulets, poules pondeuses et œufs.

Prévent et contrôle l'infestation des :
 • Poux rouges (*Dermanyssus gallinae*),
 • Petits ténébrions (*Alphitobius diaperinus*),
 • Acariens de la galle des pattes
(*Cnemidocoptes mutans*),

Et protège indirectement contre
des infections microbiennes.

voor / pour 1000 m²



Distributeur / Verdeeler: BSI Expert
Jagershoek 13, 8570 België / Belgique
+32 56 77 24 34



15 mm

115 mm

130 mm

ÉVALUATION D'UNE INFESTATION DE POUX ROUGES ET LE NOMBRE D'APPLICATIONS

| | Condition de l'environnement | Condition des oiseaux | Action |
|----------|--|---|---|
| Niveau 0 | Les parasites ne sont pas présents sur les éléments structurels comme les cages, les mangeoires, ... | - Condition des oiseaux est bonne - Production d'oeufs satisfaisante - Consommation de nourriture et poids corporel bons - Plumage totalement intact - Couleur de la crête normale | Aucune |
| Niveau 1 | Quelques parasites présents sur les éléments structurels | - Consommation et production d'oeufs normales - Poids corporel normal - Plumage totalement intact - Couleur de la crête normale - Quelques parasites sont présents sur les oiseaux | Action préventive. Une application est suffisante. Si l'infestation persiste, répétez tous les 30 jours. |
| Niveau 2 | Petits amas de parasites présents sur les éléments structurels | - Diminution de la production d'oeufs - Diminution de la consommation de nourriture - Légère diminution du poids corporel - Irritation de la peau visible - Perte de plumage visible - Des parasites sont visibles sur les oiseaux | Intervention obligatoire. Trois traitements consécutifs avec 5 à 7 jours d'intervalle. Si l'infestation persiste, répétez tous les 30 jours. |
| Niveau 3 | Gros amas de parasites présents sur les éléments structurels | - Diminution importante de la production d'oeufs - Diminution importante du poids corporel - Plumage incomplet (la peau est visible), crête pâle - Oiseaux affaiblis - Nombre importants de parasites sont visibles sur les oiseaux | Intervention obligatoire. Nettoyage complet des cages, enclos, batteries. Isolation des oiseaux atteints. Trois traitements consécutifs avec 5 à 7 jours d'intervalle. Si l'infestation persiste, répétez tous les 30 jours |

str 2

BEOORDELING VAN EEN VOGELMIJTENPLAAG EN HET AANTAL TOEPASSINGEN

| | Conditie omgeving | Conditie vogels | Actie |
|----------|---|---|--|
| Niveau 0 | Parasieten worden niet gezien op structurele elementen zoals kooien, voederbakken, etc. | - Conditie van de vogels is zeer goed - Eiproductie is bevredigend - Voederconsumptie en lichaamsgewicht is normaal - Volledig intact gevederde - Correcte kleur van de hanenkam | Geen |
| Niveau 1 | Enkelvoudige parasieten worden gezien op de structurele elementen | - Voederconsumptie en eiproductie is normaal - Lichaamsgewicht is correct - Volledig intact gevederde - Correcte kleur van de hanenkam - Enkelvoudige parasieten worden gezien op de vogels | Preventieve interventie. Eén behandeling is voldoende. Bij een aanhoudende plaag elke 30 dagen herhalen |
| Niveau 2 | Kleine clusters parasieten worden gezien op de structurele elementen | - Verminderde eiproductie - Verminderde voederconsumptie - Lichte afname lichaamsgewicht - Zichtbare irritatie van de vogels - Zichtbaar gedeeltelijk verlies gevederde - Parasieten worden gezien op de vogels | Noodzakelijke interventie. Drie opeenvolgende behandelingen met 5 tot 7 dagen tussen. Bij een aanhoudende plaag elke 30 dagen herhalen. |
| Niveau 3 | Talrijke clusters worden gezien op de structurele elementen en rond de nesten | - Aanzienlijk verminderde eiproductie - Aanzienlijk verminderd lichaamsgewicht - Onvolledig gevederde (huid is zichtbaar), bleke hanenkam - Verzwakte vogels - vogels zakken in elkaar - Talrijke parasieten worden gezien op de vogels | Onmiddellijke interventie. Volledige schoonmaken van batterijen, kooien en hokken. Afzondering van sterk aangestarte vogels. Drie opeenvolgende behandelingen met 5 tot 7 dagen tussen. Bij een aanhoudende plaag elke 30 dagen herhalen. |

115 mm

15 mm



15 mm

BAZA

270 mm

130 mm

TOEPASSING

Toepassen met drukspuit op alle oppervlakken, spleten en holten waar ectoparasiaten kunnen voorkomen, het hele jaar door en zelfs in de aanwezigheid van vogels en hun eieren.

DOSERING: 1 % OPLOSSING

100 ml product / 10 l water (1% oplossing) is goed voor de behandeling van ca. 100 m². De opgegeven dosis niet overschrijden en het mengsel binnen 24 uur opwerken.

BEREKENING TE BEHANDELEN OPPERVLAKTE:

- individuele legbatterijen: lengte kast x diepte kast x aantal rijen in de kast
- gezamenlijke open koioen en hokken: lengte grondoppervlak x breedte grondoppervlak

BEREIDING SPUITVLOEISTOF: de drukspuit eerst gedeeltelijk met water vullen. Voeg daarna de juiste hoeveelheid Dergall® toe en vul verder aan met de resterende nodige hoeveelheid water. Ten slotte goed schudden voor gebruik om een homogeen mengsel te bekomen.

IDEALE TIJDSTIP VAN TOEDIENING: wanneer de vogels kalm zijn en de insecten nog actief zijn (bv. late namiddag - vroege avond wanneer de lichtsterkte afgenomen is). Gebruik hiervoor eventueel een zwakke lichtbron.

Niet toepassen in aanwezigheid van ziekte vogels. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is in de ruimte tijdens de behandeling. Niet toepassen bij een temperatuur hoger dan 35 °C.

TOEDIENINGSWIJZE: MET DRUKSPUIT

De keuze van de drukspuit hangt af van de grootte van de te behandelde oppervlakte. Gebruik bij voorkeur een drukspuit met vlaakstraalop met debiet tussen 0,8 - 1,2 l / min. verstrooiingshoek van 80° - 110°, druppelgrootte 80 - 120 µm en druk van 3 - 5 bar.

SPUITAFSTAND VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING: hanteer een spuitafstand van 30 à 50 cm en zorg ervoor dat alle oppervlakken gelijkmatig en het volledig bevochtigd zijn (niet tot afroeiing toe).

SPUITAFSTAND VOOR NAAD-EN KIERBEHANDELINGEN: Hanteer een spuitafstand van ca. 15 cm. Het middel moet na toepassing snel opdrogen voor een optimale werking.

REINIGING: reinig de drukspuit na gebruik met water. Neem daarvoor ook de sproeidop en lans af en spoel alles (incl. dichting en vlaakstraalop) grondig af met water, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

AANTAL BEHANDELINGEN - RODE BLOEDLUZEN (Dermanssuss gallinace)

Voor een noodzakelijke interventie bij een rode vogelmitella plaag zijn ten minste drie opeenvolgende behandelingen nodig, telkens met 5 tot 7 dagen ertussen. Bij een aanhoudende plaag de behandeling elke 30 dagen herhalen. Raadpleeg onderstaande tabel om het niveau van aantasting te bepalen en het aantal toepassingen te plannen.

ANTAL BEHANDELINGEN - Piepschuimkever

De eerste toepassing moet gebeuren gedurende de gebruikelijke, regelmatige voorziening schoonmaak en desinfectie die doorgaans plaatsvindt tussen de productiecyclus. De volgende toepassing kan dan gebeuren in aanwezigheid van de dieren gedurende de cyclus. Herhaal de behandeling bij het vaststellen van een nieuwe generatie. Pas het product toe op al de zichtbare keverkolonies en verzamel deze na 30 minuten in verwijderd deze. Door de typische karakteristieke fysieke werking van dit product wordt de doeltreffendheid sterk beïnvloed door de hoeveelheid aanwezig vuil.

Het gebruik van Dergall® verhindert niet het gebruik van andere desinfecterende producten.

RISICOBERKERENDE MAATREGELEN

Plaag controleren: scherm eerst alle drink- en voederbakken af of neem ze weg. Bespuit dan alle oppervlakken en objecten in en rond de kooi, of til of het hok waar bloedluizen en andere parasieten zich kunnen schuilhouden, met bijzondere aandacht voor alle hoeken, kieren en spleten. De vogels en hun eieren hoeven niet weggenomen te worden voor de behandeling, maar bespuit ze niet rechtstreeks. **PLAAG VOORKOMEN:** eerst hokken, koioen en alle voorwerpen hierin grondig schoonmaken in afwezigheid van de dieren. Daarna Dergall® toepassen en de vogels terug binnenlaten. Een goede hygiëne is noodzakelijk voor een goede preventie van ectoparasiaten bij vogels.

APPLICATION

Appliquer avec un pulvérisateur à pression sur toutes les surfaces, crevasses et cavités où des ectoparasites peuvent apparaître, toute l'année et même en présence d'oiseaux et de leurs œufs.

DOSAGE: SOLUTION À 1%

100 ml de produit / 10 litre d'eau (solution à 1%) convient pour le traitement d'environ 100 m². Ne pas dépasser la dose spécifiée et utiliser le mélange dans les 24 heures.

CALCUL DE LA SURFACE À TRAITER:

- batteries de ponte individuelles: longueur de la batterie x profondeur de la batterie x le nombre d'étages dans la batterie
- cages communes et enclos ouverts: longueur de la surface au sol x largeur de la surface au sol

PRÉPARATION DE LA SOLUTION: remplissez d'abord le pulvérisateur à pression partiellement avec de l'eau. Ajoutez ensuite la quantité correcte de Dergall® et complétez avec la quantité d'eau nécessaire restante. Enfin, bien agiter avant utilisation pour obtenir un mélange homogène.

MOMENT IDEAL D'APPLICATION: lorsque les oiseaux sont calmes et les insectes les plus actifs (p. ex. en fin d'après-midi - en début de soirée quand la luminosité est déjà plus faible). Utilisez éventuellement une source de lumière faible pour cela.

Ne pas appliquer en présence d'oiseaux malades. Assurez-vous qu'il y ait une ventilation adéquate dans la pièce pendant le traitement. Ne pas appliquer à une température supérieure à 35 °C.

MÉTHODE D'APPLICATION: AVEC PULVÉRISATEUR

Le choix du pulvérisateur à pression dépend de la taille de la surface à traiter. Utilisez de préférence un pulvérisateur à pression avec une buse à fente avec un débit compris entre 0,8 et 1,2 l/min, un angle de diffusion de 80 à 110°, une taille de gouttelette de 80 à 120 µm et une pression de 3-5 bars.

à l'entière de surface, maintenez une distance de 30 à 50 cm et assurez-vous que toutes les surfaces sont uniformément et complètement traitées (mais pas ruisseleant).

TRAITEMENT DE JOINTS ET FISSURES: Utiliser à une distance d'environ 15 cm pour le traitement de joints et fissures. Le produit doit sécher rapidement après l'application pour un effet optimal.

NETTOYAGE: nettoyez le pulvérisateur à pression avec de l'eau après utilisation. Pour ce faire, retirez également le capuchon de pulvérisation et la lance et rinsez soigneusement le tout (incl. joint et buse) à l'eau, à l'intérieur comme à l'extérieur.

NOMBRE DE TRAITEMENTS - POUX ROUGES (Dermanssuss gallinace)
Pour une intervention indispensable en cas d'une infestation de poux rouges, trois traitements consécutifs avec 5 à 7 jours d'intervalle sont nécessaires. Si l'infestation persiste, répétez le traitement tous les 30 jours. Consultez le tableau ci-dessous pour identifier le niveau de l'infestation et le nombre d'applications.

NOMBRE D'APPLICATIONS - Petits Ténédrions

L'application initiale doit avoir lieu pendant le nettoyage et désinfection habituelle et qui ont généralement lieu entre les cycles de production. L'application suivante peut alors se faire en présence des animaux pendant le cycle. Répétez le traitement lors de l'établissement d'une nouvelle génération. Appliquer le produit sur toutes les colonies de coléoptères visibles et après 30 minutes, collecter et jeter. En raison de la réaction physique typique de ce produit, son efficacité est fortement influencée par la quantité de saleté présente.

L'utilisation de Dergall® n'empêche pas l'utilisation d'autres produits désinfectants.

MESURE POUR LIMITER LE RISQUE

CONTROLE ANTI PARASITAIRE: d'abord protéger ou enlever tous les abreuvoirs et les mangeoires. Vaporiser toutes les surfaces et tous les objets à l'intérieur et autour de la cage, du greiner ou de l'enclos où les poux rouges et autres parasites peuvent se cacher, en portant une attention particulière à tous les coins, fissures et crevasses. Les oiseaux et leurs œufs n'ont pas besoin d'être retirés pour le traitement, mais ne vaporisez pas directement sur les animaux ou les œufs. **PRÉVENIR L'INFESTATION:** nettoyez d'abord soigneusement les enclos, les cages et tous les objets qu'ils contiennent en l'absence des animaux. Ensuite, appliquez Dergall® et laissez les oiseaux revenir. Une bonne hygiène est nécessaire pour une bonne prévention des ectoparasites chez les oiseaux.

Lees voor gebruik altijd het etiket en de bijsluiter en respecteer de daarbij gegeven instructies voor een veilige en doeltreffende toepassing.

ALGEMENE PRODUCTBESCHRIJVING

Dergall® is een pesticidenvrij, wateroplosbaar concentraat met fysieke werking; het product met een gepatenteerde formulatie vormt een driedimensionaal net rondom de ectoparasiet en eventueel aanwezige eitjes (Ecto Net Technology). Toepasbaar in de aanwezigheid van vogels en eieren. Het product is niet toxicisch en dringt de eieren en de kippen zelf niet binair. Dergall® heeft naast een werking tegen frequent voorkomende bloedluizen, piepschuimkevers, en kalkpootmijten, ook een interessante werking tegen overige kleine insecten, mijten,... en helpt dus plagen te voorkomen en bestrijden. Dergall® verbetert de algemene gezondheid van de vogels door het stressniveau en het risico op ziektes, veroorzaakt door ectoparasieten, te verminderen, en verhoogt de eiproductie. Dergall® bevat geen insecticide, is geur-en kleurloos, kan toegepast worden in aanwezigheid van vogels en eieren, en werkt meteen. Dankzij haar fysieke werking is er geen risico op resistentie.

GEVARENAANDUIDINGEN: veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

BEVAT: Polyalkylenoxide modified heptamethyltrisiloxane.

VEILIGHEIDSAAHNBEVELINGEN: bij het inwinnen van gedetailleerde advies, de verpakking of het etiket ter beschrijving. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van nevel vermijden. Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. Voorkom bezinning in het milieu. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten tot de irritatie verdwijnen, indien mogelijk blijven spoelen. **NA INADEMING:** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. **VERWIJDERING:** inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / nationale voorschriften. Antigifcentrum (BE) +32 (0)70 245 245. **OPSLAG:** bewaren op een droge plaats tussen 0 °C - 30 °C. **HOUDBARHEID:** 4 jaar na productiedatum. Dergall® tegen bloedluizen, mijten en piepschuimkever / Contre les poux rouges, les acariens et les ténédrions

WERKING / Méthode d'action: fysieke werking / action physique
Bevat / Contient: Polyalkylenoxide modified heptamethyltrisiloxane.
Inhoud / Contenu: 1 Liter / Litre

WAARBORG: wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor onvoldoende werking, schade of ongevalen voortkomende uit door ons niet gecontroleerde toepassing.

GARANTIE: nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous n'acceptons aucune responsabilité pour une efficacité insuffisante, des dégâts éventuels ou des accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous./voir emballage

REV-202103-1-4
Lotnr en productiedatum / N° de lot et date de production:
zie verpakking / voir emballage

Lisez toujours l'étiquette ou la notice avant utilisation et respectez toutes les instructions fournies pour une application sûre et efficace.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT

Dergall® est un concentré hydrosoluble sans pesticides avec action physique: le produit avec formule brevetée crée une structure tridimensionnelle autour de l'ectoparasite et des œufs éventuels (Ecto Net Technology). Applicable en présence de oiseaux et leurs œufs. Le produit est non toxique et ne pénètre pas dans les œufs et les poulets eux-mêmes. Dergall® a un effet contre les poux rouges, les acariens de la galle des pattes, et les petits ténédrions, mais a également un effet contre d'autres petits insectes, acariens, etc. et aide à prévenir des infestations parasitaires. Ce produit améliore la production d'œufs et la santé générale des oiseaux en diminuant le niveau de stress généré par des maladies causées par des ectoparasites. Dergall® est immédiatement efficace, ne contient pas d'insecticides, est inodore et incolore, et est applicable en présence d'oiseaux et d'œufs. Grâce à son effet physique, il n'y a aucun risque de résistance.

MENTIONS DE DANGER: provoque une grave irritation oculaire. Nocif par inhalation. Toxique pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.

CONTIENT: Polyalkylenoxide modified heptamethyltrisiloxane.

CONSEILS DE PRUDENCE: en cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Éviter le rejet dans l'environnement. Evitez de les lancer les brouilliards / vapeurs. Porter des gants de protection. Utiliser un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution le contact à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si elles sont portées et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **EN CAS D'INHALATION:** transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. **ELIMINATION:** éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Centre Anti-Poissons (BE): +32 (0)70 245 245; (G.D.-de-Lux) +352 8002 5500; (France-Nancy) +33 383 22 50 50. **STOCKAGE:** stocker dans un endroit sec entre 0 °C - 30 °C. **DUREE DE CONSERVATION:** 4 ans à compter de la date de production.

WAARSCHUWING ATTENTION



UFI: 4801-C0SJ-G00G-MYA8



5 420046 644344

115 mm

tolia
transparentna

15 mm

150 mm