

DES-F, 16059 N

7 augustus 2020

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen), gisten, schimmels en virussen

1. door middel van vernevelen, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing, in:
 - A. lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddestoelen. Uitgezonderd toepassingen in bewaarplaatsen voor bloembol- en bloemknolgewassen, door middel van bol- en fustbehandeling, alsmede voor ruimtebehandeling.
 - B. dierverblijfplaatsen met bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen)

en als middel ter bestrijding van bacteriën (incl. mycobacteriën, maar excl. bacteriesporen)

2. op hoeven van rundvee en schapen door middel van hoefbaden.

De dosering zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing moeten worden aangehouden. De desinfectie moet worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing.

Vernevelen van het middel is niet toegestaan in ruimten waarin zich mensen, dieren, sier- en/of consumptiegewassen bevinden.

Het middel niet in direct contact met dieren laten komen, met uitzondering van de hoeven.

Om verminderd functioneren van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) te voorkomen, dienen afvalresten die het middel bevatten geloosd te worden op de mestkelder of op de gemeentelijk riolering.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Desinfectie door middel van vernevelen mag uitsluitend worden uitgevoerd door professionals, die een opleiding voor ruimtedesinfectie hebben gevolgd.

De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

1. Desinfectie uitsluitend middels vernevelen m.b.v. straalmotorapparatuur gebruikt volgens onderstaande instructie

De te desinfecteren ruimten, oppervlakken en apparatuur eerst grondig reinigen. Een daarbij gebruikt reinigingsmiddel wegspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Materialen die in contact kunnen komen met diervoer of drinkwater voor dieren na behandeling grondig afspoelen met schoon water.

Algemene instructies voor vernevelen:

- Behandeling uitvoeren bij een temperatuur boven 15°C, indien nodig de ruimte eerst verwarmen.
- Ventilatie van de betreffende ruimte uitzetten en ventilatieopeningen dichtmaken.
- Draag de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: adembescherming (B2 grijs), handschoenen en een goed sluitend spuitpak.
- Vul geschikte apparatuur met de juiste hoeveelheid middel, zet de apparatuur aan en verlaat direct de ruimte.
- Houd vervolgens de ruimte gedurende 24 uur gesloten.
- Verwarm de ruimte tot boven 15°C, ventileer de restdampen uit de ruimte totdat de ruimte volledig droog is.
- Indien de behandelde ruimte betreden moet worden voor eventuele tussentijdse bemonstering, moeten dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen als hierboven voorgeschreven gedragen worden.
- Voor bemonstering worden Dräger adsorptiebuisjes, meetbereik 0,2 – 2,5 mg/m³ geadviseerd.
- Als grenswaarde voor het betreden van de ruimte worden de beroepsmatige blootstellinglimieten voor formaldehyde gehanteerd (MAC-TGG 15 minuten: 0,5 mg/m³, MAC-TGG 8 uur: 0,15 mg/m³)

1A. Lege ruimten bestemd voor de kweek van consumptie- en siergewassen en paddestoelen. Uitgezonderd toepassingen in bewaarplaatsen voor bloembol- en bloemknolgewassen, door middel van bol- en fustbehandeling, alsmede voor ruimtebehandeling.

Dosering: 2% (2 liter middel aanvullen met water tot 100 liter),
Gebruik 5 tot 6 liter oplossing per 100 m³ ruimte.

1B. Dierverslijfplaatsen en bijbehorende stallen en materialen (machines en gereedschappen)

Dosering: onverdund middel, 1,3 tot 2,5 liter middel per 100 m³. Het is ook mogelijk om het middel verdund in water toe te passen. Hierbij moet een vergelijkbare hoeveelheid middel (1,3 tot 2,5 liter onverdund middel/100 m³) toegepast worden.

2. Desinfectie middels hoefbaden

Het middel is bestemd voor het desinfecteren van hoeven van rundvee en schapen. De te desinfecteren hoeven eerst grondig reinigen met schoon water. Vul een schone bak, eventueel voorzien van een voetenmat, met water en voeg het middel toe. Plaats de bak zodanig dat het vee er doorheen loopt.

Dosering: 4% (4 liter middel aanvullen met water tot 100 liter).

De oplossing gedurende maximaal 24 uur, na het vullen van de bak, gebruiken.

Bij routinematig gebruik: iedere 2 á 3 weken herhalen.

Bij ad-hoc behandeling: 1 á 2 keer per week.

N.B.: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen en wanneer het vervuild is met organisch materiaal.