

BRODITOX

CRÉME

NIEUWE
FORMULE



INDUFARM

Together for **better** farming

A02329

BRODITOX CRÈME



Broditox Crème is een specifieke formulering, met een onvergelijkbare smaak en zeer aantrekkelijk voor knaagdieren, zelfs in aanwezigheid van andere voedingsstoffen. Het lokaas is ontworpen voor de bestrijding van knaagdieren in en rond gebouwen. Het product wordt verpakt in bulk in emmers van 5 kg. Het lokaas wordt aangebracht en gedoseerd in de lokaasdozen met een spatel. De smeulige structuur verzekert een goede en veilige hechting van het lokaas in de lokdoos. Na aanknaging kan het lokaas met een spatel opnieuw gladgestreken worden om een volgende evaluatie mogelijk te maken.

- Gebruiksklaar. Gepelde haver
- Rijk aan vetstoffen en verscheidene lokstoffen waaronder hennep
- Actieve stof: 50 ppm Brodifacoum. Kleine hoeveelheden volstaan om de knaagdieren te doden
- Erkeningsnummer: BE2013-0035 & 11/13/L-000 (Luxemburg)

Smakelijker, betere opname, **nog dodelijker**

Aanbevelingen voor gebruik

Evalueer de infestatie in termen van omvang en uitbreiding. Identificeer de zones die idealiter uitgerust moeten worden met lokaasdozen: in de buurt van nestplaatsen, langs loopsporen, in de buurt van voederplaatsen, maar ook in holle structuren. Verwijder al het mogelijke voedsel dat met het lokaas concurreert. Het product moet worden toegepast in veilige lokdozen. Inspecteer uw lokdozen om de 2 à 3 dagen voor muizen en om de 5 à 7 dagen voor ratten. Vervang lokaas dat verbruikt of beschadigd is. Elimineer de waarschijnlijke oorzaken van de infestatie. Neem de nodige hygiënemaatregelen, ontnem de toegang tot voedsel en zorg voor voldoende wering om verdere infestaties te voorkomen. Het product niet rechtstreeks in de hopen toepassen.

Dosering

Muis (*Mus musculus*), gebruik binnen en buiten rond gebouwen: 10g lokaas per lokaasdoos. Indien meer dan één lokaasdoos vereist is, moet de minimumafstand tussen twee dozen 3 meter bedragen.

Bruine ratten (*Rattus norvegicus*), gebruik binnen en buiten rond gebouwen: 60g lokaas per lokaasdoos. Indien meer dan één lokaasdoos vereist is, moet de minimumafstand tussen twee dozen 5 meter bedragen.

Wij raden aan om voldoende lokaasdozen te plaatsen in functie van de infestatiegraad, om de opname van het lokaas te stimuleren.

- BIOCIDE PT 14, RODENTICIDE GESLOTEN CIRCUIT
- FORMULERINGSSTYPE: lokmiddel klaar voor gebruik.
Lokaaspasta ivan gepelde haver
- WERKZAME STOF: Brodifacoum 0.004%. Bevat Bitrex
- CHEMISCHE KLASSE: 4-hydroxycoumarin.
Anticoagulant 3e generatie
- WERKINGSWIJZE: anticoagulant, antagonist voor vitamine K
- TOEGELATEN DOELORGANISMEN: muizen (*Mus musculus*) & bruine ratten (*Rattus norvegicus*)
- BESTELREFERENTIE: A02329 - emmers van 5 kg

SPECIFIEKE GEBRUIKSIINSTRUCTIES:

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken. Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfecteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat, waar de knaagdieren actief zijn en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen. Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfecteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt. Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en waar mogelijk fysieke bestrijdingsmethoden. Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, holen, nesten enz.). Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt. Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden. Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging. Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het aasstation. Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten. Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.

Muizen: De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

Ratten: De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna minstens wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil. Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan. Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering. Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Gebruik tegen ratten en muizen buiten rond gebouwen, tegen ratten buiten in open gebieden en vuilstortplaatsen: Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil. Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode. Voor gebruik buiten moet het lokaas afgedekt zijn en op een veilige manier worden uitgelegd om het risico op consumptie door non-target organismen zo klein mogelijk te houden.

Risicobeperkende maatregelen:

Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders over de knaagdierbestrijdingscampagne. Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen. De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling. Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel. Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water. Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming.

Gebruik tegen huismuizen en/of ratten binnen gebouwen (P en P+): Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.

Gebruik tegen huismuizen en/of ratten buiten rond gebouwen (P en P+): Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bv. regen, sneeuw). Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden. Wanneer aasstations dicht bij oppervlaktewateren of afwateringssystemen (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen. Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil. Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode. Voor gebruik buiten moet het lokaas afgedekt zijn en op een veilige manier worden uitgelegd om het risico op consumptie door non-target organismen zo klein mogelijk te houden. Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. Rodenticiden op basis van anticoagulantia mogen niet als permanent lokaas worden gebruikt of als middel om de knaagdieractiviteit te monitoren. Gebruik het product niet in gepulseerde lokaasbehandelingen. Dit product niet direct in de holen toepassen. Wanneer aasstations dicht bij oppervlaktewateren of afwateringssystemen (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen. Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren. Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren. Houdbaarheid: 12 maanden. Niet opslaan nabij geurende chemische agentia.

Overige informatie:

Vanwege de vertraagde werking kan het na inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn. Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen. Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.