

INDUFARM

Together for better farming



Dry Protection 1000 kg e

Hygiënepoeder
Hoge vochtopname en absorberende capaciteit

- EIGENSCHAPPEN:**
- Hoge absorptiecapaciteit
 - Beheer van ammoniak
 - Met 100% natuurlijke essentiële oliën

SAMENSTELLING:

Ingrediënten van minerale en plantaardige oorsprong, essentiële oliën en plantenextracten. Bevat essentiële olie van Eucalyptus globulus, die een allergische reactie kan veroorzaken.

OPSLAG:

Bewaren in de originele verpakking, goed afgesloten, uit de buurt van warmte en licht. Onmiddellijk na opening gebruiken.

DOSERING:

Herkauwers: Melkkoelen in ligboxen: 100 tot 150 g per dier, 3 keer per week.
Melkkoelen met stro: 300 g per dier, 3 keer per week.
Kalfren: 80 g per kalf, 3 keer per week.
Schapen, geiten: 50 tot 80 g per dier, twee keer per week, vooral in natere gebieden.
Varkens: Zeugen, geten en slachtvarkens: 50g per dag per dier op de bewegingsruimten, aan de achterkant van zeugen in de kraamafdeling, op nesten en warmtebedden.
Biggen: Direct toepassen op biggen bij het werpen.
Strooi: Een handvol in de nesten of op de kooiplaten 2 keer per dag gedurende 2 tot 3 dagen na het werpen.
Pluimvee: 50 g per m², tweemaal per week, met de nadruk op de natere gebieden.
Paarden: Bij het vernieuwen van de bodembedekking tot 3 kg per stal strooien. Strooi voor onderhoud 500 g, 2 tot 3 keer per week, afhankelijk van de staat van het strooisel.

Asséchant litière et haut pouvoir absorbant
Poudre d'hygiène

- PROPRIÉTÉS:**
- Haute capacité d'absorption
 - Gestion de l'ammoniac
 - Aux huiles essentielles 100% naturelles

COMPOSITION:

Ingrediënten d'origine minérale et végétale, huiles essentielles et extraits végétaux. Contient de l'huile essentielle d'Eucalyptus globulus pouvant entraîner une réaction allergique.

STOCKAGE:

Stocker dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur et de la lumière. A utiliser rapidement après ouverture.

DOSAGE:

Ruminants : Vaches laitières en logettes : 100 à 150 g par bovin, 3 fois par semaine.
Vaches laitières en aires paillées : 300 g par bovin, 3 fois par semaine.
Veaux: 80g par veau, 3 fois par semaine.
Ovins, caprins : 50 à 80 g par animal, 2 fois par semaine, en insistant sur les zones d'exercice, à l'arrière des truies en maternité, sur les nids et plaques chauffantes avant la mise bas.
Porcs : Truies, cochettes et porcs charcutiers : 50 g par jour et par animal sur les aires d'exercice, à l'arrière des truies en maternité, sur les nids et plaques chauffantes avant la mise bas.
Porclets : Appliquer directement sur les porcelets lors de la mise-bas.
Sautpoudre une poignée dans les nids ou sur les plaques chauffantes 2 fois par jours pendant 2 à 3 jours après la mise bas.
Volailles : 50 g par m², 2 fois par semaine, en insistant sur les zones plus humides.
Chevaux : Au renouvellement de la litière, étendre jusqu'à 3 kg par box. En entretien, étendre 500 g, 2 à 3 fois par semaine selon l'état de la litière.

Ce produit peut être utilisé en agriculture biologique conformément aux règlements UE 2018/848 et 2021/1165.

Fab. Nr.

Pro. Date

Exp. Date

Hygiene powder
High moisture absorption and absorbent capacity

- PROPERTIES:**
- High absorption capacity
 - Ammonia management
 - With 100% natural essential oils

COMPOSITION:

Ingredients of mineral and plant origin, essential oils and plant extracts. Contains Eucalyptus globulus essential oil, which may cause an allergic reaction.


STOCKAGE:

Store in the original packaging, tightly closed, away from heat and light. Use immediately after opening.

DOSAGE:

Ruminants: Dairy cows in cubicles: 100 to 150 g per animal, 3 times a week.
Straw-fed dairy cows: 300g per animal, 3 times a week.
Calves: 80g per calf, 3 times a week.
Sheep, goats: 50 to 80g per animal, twice a week, focusing on wetter areas.
Pigs: Sows, gilts and butcher pigs: 50g per day per animal on exercise areas, at the back of pens in the maternity ward, on nests and hot plates before farrowing.
Apply directly on piglets at farrowing.
Piglets: Apply directly to piglets at farrowing. Sprinkle a handful in the nests or on the hot plates 2 times a day for 2 to 3 days after farrowing.
Poultry: 50 g per m², twice a week, concentrating on wetter areas.
Horses: When renewing bedding, spread up to 3 kg per box.
For maintenance, spread 500 g, 2 to 3 times a week, depending on the condition of the bedding.

This product can be used in organic farming in accordance with EU regulations 2018/848 and 2021/1165.



A00163

INDUFARM nv | Leon Bekaertstraat 5 | B-8770 Ingelmunster | info@indufarm.com | www.indufarm.com