



BUGSTER

PRODUCTOMSCHRIJVING

Geconcentreerd insecticide lak bestemd voor de bestrijding van kruipende en vliegende insecten (kakkerlakken, bedwantsen, vlooien, mieren, spinnen, vliegen, wespen, horzels, bloedluizen, enz ...).

SAMENSTELLING EN FORMULATIE

Cypermethrine 10 %.

Prallethrine 2 %.

EC – emulgeerbaar concentraat.

DOELORGANISMEN

Vliegende en kruipende insecten.

TOEGELATEN GEBRUIK

BE : BE-REG-00191 – Professioneel gebruik, gesloten circuit.

TOEPASSINGSGBIED

Insecticide tegen kruipende en vliegende insecten om te verdunnen en vervolgens te sproeien of te vernevelen op oppervlakken binnen en buiten gebouwen, stallen, melkveebedrijven enz. Aan een dosering van 25-50 ml in 5 L water/100 m² oppervlakte behandelen door sproeien en 50 ml in 5 L water voor 500 m³ door verneveling/foggen.

Tests uitgevoerd door het laboratorium T.E.C. in Frankrijk hebben een 100% sterfte-efficiëntie aangetoond op allerlei soorten kruipende en vliegende insecten met een schokeffect in minder dan een uur en een nawerking tot 12 weken. Dit rapport is op aanvraag verkrijgbaar.

Bugster kan gebruikt worden tegen kruipende en vliegende insecten.

Tegen kruipende insecten

Het product moet worden aangebracht waar insecten worden aangetroffen, d.w.z. langs plinten, pijpen, hoeken van muren, planken, onder warmtegenererende apparaten (keukens, badkamers, toiletten) , enz ...

Gebruik Bugster in het bijzonder in pluimveestallen als volgt tegen:

Bloedluizen: Behandel één week vóór leegstand. Identificeer alle gebieden waar de bloedluizen verblijven, d.w.z. kooien, kieren, scheuren en spleten, uiteinden van metalen staven, alle gebieden waar twee oppervlakken samenkomen en gebieden waar het stof zich opstapelt. Verwijder stof van het te behandelen oppervlak. Breng Bugster aan op de gebieden die zijn geïdentificeerd met een vlakstraalsproeier voor fijn spuiten met een maximale druk van 2 bar. Blijf spuiten totdat de vloeistof van het behandelde oppervlak afloopt.

Isolatiekevers: Gebruik Bugster als spray tijdens de leegstand, na het plaatsen van het strooisel en vóór de introductie van de uitrusting (drink- en voederpannen, etc.). Pas de oplossing toe in twee stappen:

1. Spray op de basis van de muren (1 m hoog) en op de rand van het strooisel (op een strook van 1 m breed)
2. Smit onder de platen (op een strook van 1 m breed)

Tegen mieren

Het product moet worden aangebracht op de gebieden die door mieren worden bezocht, rond het nest of besproeid op de mierenhoop.

Tegen vliegende insecten

Het product moet worden toegepast waar insecten kunnen worden aangetroffen, zoals op ramen, deurkozijnen, balken, muren en plafonds.

Tegen wespen

Besproei het nest.

VERPAKKINGEN

Fles 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L.



COMMERCIELE INFORMATIE

- De combinatie van de twee actieve ingrediënten Cypermethrine en Prallethrine genereert een schokwerking en een gegarandeerde nawerking. Het product is makkelijk in gebruik.
- Dankzij de formulering op basis van oplosmiddelen hecht het sterk op materialen, vooral op tegels en aardewerk.
- Ideaal voor oppervlaktebehandelingen binnenshuis en elke keer dat een lange nawerking nodig is, in het bijzonder: in woningen, gemeenschappelijke ruimtes van gebouwen, vuilcontainers en -opslag en alle technische ruimtes, enz ...

TOXICOLOGIE EN AANBEVELINGEN

Dek voer, ruwvoer, kooien en aquaria af of verwijder ze voor gebruik. Bevat pyrethroiden. Giftig voor katten. Buiten het bereik van kinderen houden.

Voor gebruik in stallen en melkveebedrijven: Dek bij (melk)veebedrijven zorgvuldig (ruw)voeder, voer- en drinkbakken af, evenals melkmachines en dierenbevestigingen. Alleen toepassen op plaatsen buiten het bereik van dieren. Mag niet op het lichaam van het dier worden aangebracht en mag niet worden gemengd met bleekmiddelen.

In geval van verneveling/foggen: blijf niet in de ruimte tijdens de werkzaamheden behalve indien gebruiker ademhalingsbescherming draagt.

Raadpleeg steeds de MSDS.

