

Deltasect

Insecticide voor gebruik tegen kruipende insecten. Suspensieconcentraat insecticide. DELTASECT kan gebruikt worden in kieren en naden. Dit middel werkt tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken, mieren, kruipende insecten binnenshuis. DELTASECT is geschikt voor de bestrijding van kruipende insecten in ruimtes zoals huizen, appartementen, winkelcentra, bioscopen, hotels, restaurants, bars, kintines, ziekenhuizen, industriële magazijnen.

Samenstelling en formulering

Het middel is een suspensie concentraat, op basis van 2,394 % Deltamethrine. Deltamethrine is een synthetisch pyrethroïde dat een neurotoxisch effect (giftig voor het zenuwstelsel van het ongedierte) heeft op insecten bij aanraking of inademing. Pyrethroiden veroorzaken repetitieve zenuwimpulsen door het openhouden van natrium-ionenkanalen. Hierdoor gaan de insecten die in aanraking komen met DELTASECT binnen enkele minuten tot enkele uren dood.
SC – suspensieconcentraat.

Toepassingen

Suspensieconcentraat insecticide voor gebruik in kieren en naden tegen kruipende insecten zoals kakkerlakken en mieren.
Gebruik binnenshuis, met lage drukspuit (handspuit en rugspuit).
50 ml product in 5 L water per 100 m² oppervlak – (1% / 1:100).
Maximaal 6-8 toepassingen per jaar. Toepassing kan na 2 maanden herhaald worden.

Toxicologie en aanbevelingen

DELTASECT toepassen met behulp van een pomp of spuitapparaat. Alleen toepassen in kieren en naden.

Het product in water verdunnen in een verhouding van 1:100. De verkregen oplossing spuiten in een dosering van 1 liter gebruiksooplossing per 20 m². De gebruiksooplossing toepassen door middel van een lagedrukspuit (hand- of rugspuit).

Toepassen met een maximale spuitbreedte van 0,1 m op de behandelde oppervlakken.

Bij het leegmaken VERPAKKINGEN GRONDIG NASPOELEN met behulp van een geïntegreerd spoelapparaat onder druk of drie keer handmatig omspoelen. Gebruik reinigingsmiddel voor het spuitapparaat.

Voorkom dat spoelwater naar het riool wordt gespoeld. Het product is niet bedoeld om te worden gebruikt in ruimtes waar dieren worden gehuisvest. Blootstelling aan gehuisveste dieren wordt daarom niet verwacht.

Alleen als insecticide gebruiken. Alleen voor gebruik binnenshuis.

Was uw handen en rechtstreeks blootgestelde huid na het hanteren van het product voor het eten, drinken en roken. Niet mengen met andere chemicaliën en producten.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken. Niet toepassen in het bijzijn van mensen (met name kinderen) en (huis-)dieren. Aangemaakte spuitoplossing nooit bewaren. Voor elk gebruik een nieuwe spuitoplossing aanmaken.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verwijder voedingsmiddelen en diervoeder voorafgaand aan behandeling. Verwijderd houden van voorwerpen die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en diervoeder. Dek wateropslagtanks, oppervlakken voor voedselbereiding, apparatuur voor voedselbereiding en bestek af met ondoorlaatbaar plastic voorafgaand aan behandeling.

Behandelde ruimten kunnen opnieuw betreden worden door mens, huis- en andere dieren, zodra de behandelde oppervlakken weer droog zijn.

Resistentiebeheer:

Deltamethrin wordt gebruikt in biocides gedurende een beperkte periode en draagt derhalve naar verwachting niet bij aan de ontwikkeling van resistentie in doelorganismen. Om resistentieontwikkeling in doelorganismen te voorkomen wordt aangeraden het gebruik van deltamethrin bevattende producten af te wisselen met andere insecticiden die geen pyrethroiden bevatten.

Raadpleeg steeds de MSDS fiche.



**PROFESSIEEEL
EN NIET-PROFESSIEEEL
GEBRUIK**

DOELORGANISMEN

Kruipende insecten

TOELATINGEN

BE : BE2018-0017
NL : NL-0018318-0000

HOUDBAARHEID

2 jaar in gesloten verpakking

ADDITIONELE INFORMATIE

Verminder het risico op resistentie door af te wisselen in actieve stoffen

VERPAKKINGEN

Doseerfles 500 ml

MAJ/JMR/05/09/22

ARMOSA SA/NV

1, rue des Tuiliers
B-4480 Hermalle-sous-Huy

T. +32(0)85 519 519

M. info-be@armosa.eu W. www.armosa.eu



ARMOSA