

EspermaPlus®



FR ALIMENT COMPLÉMENTAIRE MINÉRAL pour l'alimentation des verrats

COMPOSANTS: Carbonate de calcium, Phosphate monocalcique, Dextrose, Sel sodique de l'acide butyrique, Levures inactivées, Algues sèches.

COMPOSANTS ANALYTIQUES: CALCIUM 13,7 % ; SODIUM 1,7 % ; PHOSPHORUS 4,2 % ; LYSINE 4,17 % ; METHIONINE 5,56 %.

ADDITIFS (composition pour 1 kg): VITAMINES, PROVITAMINES ET SUBSTANCES CHIMIQUEMENT DÉFINIES AYANT UN EFFET ANALOGUE: Vitamine A (3a672a) 560 000 UI ; Vitamine D3 (3a671) 15 000 UI ; Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) (3a700) 9 445 mg ; Vitamine K3 (3a710) 85 mg ; Vitamine C (3a300) 8 336 mg ; Vitamine B1 (3a821) 80 mg ; Vitamine B2 (3a825ii) 336 mg ; Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) (3a831) 70 mg ; Vitamine B12 (3a835) 1,3 mg ; Niacine (3a314) 1 250 mg ; D-pantothénate de calcium (3a841) 560 mg ; Acide folique (3a316) 123 mg ; Chlorure de choline (3a890) 22 220 mg ; Bétaine HCl (3a925) 13 885 mg ; L-Carnitine (3a910) 7 225 mg.

COMPOSÉS D'OLIGO-ÉLÉMENTS*: Sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103) 560 mg ; Iodure de potassium (3b201) 14 mg ; Chélate de cuivre (II) avec la glycine, hydraté solide (3b413) 290 mg ; Chélate de manganèse d'hydrate de glycine (3b506) 550 mg ; Chélate de zinc d'hydrate de glycine (solide) (3b607) 830 mg ; Sélénométhionine (Sacch. cerevisiae) (3b8.11) 6,7 mg.

ACIDES AMINÉS, LEURS SELS ET ANALOGUES: Lysine / Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur (3.2.3) 51 960 mg ; DL-Méthionine (3c301) 56 000 mg ; L-Thréonine (3c410) 32 160 mg ; L-Tryptophane (3c440) 8 400 mg.

CONSERVATEURS: Acide citrique (1a330) 166,5 mg.

ANTIOXYDANTS: Butylhydroxytoluène (BHT) (E321) 166,5 mg ; Gallate de propyle (E310) 166,5 mg.

ANTIAGGLOMÉRANTS: Sépiolite (E562) 100 g ; Acide silicique précipité et séché (E551a) 4,9 g.

RÉDUCTEURS DE LA CONTAMINATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX PAR LES MYCOTOXINES: Aflatoxine B1 Bentonite (1m558) : ≥ 70 % smectite (montmorillonite dioctaédrique) 75 000 mg.

AROMATISANTS: Mélange d'aromatizants 18 000 mg.

MODE D'EMPLOI: 90 g par animal et par jour ou administré dans les aliments à raison de 30 kg/tonne.

* La teneur en oligoéléments est exprimée en quantité de substance active. La quantité totale de bentonite ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet de 20 000 mg/kg

INTERACTIONS ET INCOMPATIBILITÉS

L'utilisation simultanée avec de l'eau potable dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté doit être évitée

CONSERVATION : Conserver dans un endroit frais et sec (environ 25 °C) et dans son emballage d'origine. Une fois ouvert, maintenir l'emballage bien fermé. À utiliser de préférence avant : voir l'emballage.

NL MINERAAL AANVULLEND VOEDER bestemd voor beren

SAMENSTELLING: Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Dextrose, Natriumzout van boterzuur, Gedeactiveerde gisten, Gedroogde algen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: CALCIUM 13,7%; NATRIUM 1,7%; FOSFOR 4,2%; LYSINE 4,17%; METHIONINE 5,56%.

ADDITIEVEN SAMENSTELLING PER 1 KG: VITAMINEN, PROVITAMINEN EN CHEMICALLY WELL-DEFINED SUBSTANCES MET EEN GELIJKSOORTIG EFFECT: Vitamine A (3a672a) 560.000 IE; Vitamine D3 (3a671) 15.000 IE; Vitamine E (DL-alfa-tocoferolacetaat) (3a700) 9.445 mg; Vitamine K3 (3a710) 85 mg; Vitamine C (3a300) 8.336 mg; Vitamine B1 (3a821) 80 mg; Vitamine B2 (3a825ii) 336 mg; Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) (3a831) 70 mg; Vitamine B12 (3a835) 1,3 mg; Niacine (3a314) 1.250 mg; D-calciumpantotenaat (3a841) 560 mg; Foliumzuur (3a316) 123 mg; Cholinechloride (3a890) 22.220 mg; Betaine HCl (3a925) 13.885 mg; L-Carnitine (3a910) 7.225 mg.

SPOORELEMENTVERBINDINGEN*: Ijzersulfaat (II) monohydraat (3b103) 560 mg; Kaliumjodide (3b201) 14 mg; Koper(II)glycinaat, gehydrateerd, vast (3b413) 290 mg; Mangaan(glycinaat)hydraat (3b506) 550 mg; Zink(glycinaat)hydraat, vast (3b607) 830 mg; Selenomethionine (Sacch. Cerevisiae) (3b8.11) 6,7 mg.

AMINOZUREN, HUN ZOUTEN EN ANALOGEN: Lysine / L-lysine-monohydrochloride, technisch zuiver (3.2.3) 51.960 mg; DL-Methionine (3c301) 56.000 mg; L-Threonine (3c410) 32.160 mg; L-Tryptofaan (3c440) 8.400 mg.

CONSERVERINGSMIDDELEN: Citroenzuur (1a330) 166,5 mg.

ANTIOXIDANTEN: Butylhydroxytoluëen (BHT) (E321) 166,5 mg; Propylgallaat (E310) 166,5 mg.

ANTIKLONPMIDDELEN: Sepioliet (E562) 100 g; Neergeslagen en gedroogd kiezelzuur (E551a) 4,9 g.

REDUCTIEMIDDELEN VAN MYCOTOXINEBESMETTING IN DIERVOEDER: Aflatoxine B1 Bentoniet (1m558): ≥ 70% smectiet (dioctaëdrische montmorilloniet) 75.000 mg.

AROMATISCHE STOFFEN: Mengsel van aromatische stoffen 18.000 mg.

GEbruiksaanwijzing: 90 g per dier per dag of toegediend via het voeder in een hoeveelheid van 30 kg per ton.

* Het gehalte aan sporenelementen wordt uitgedrukt als de hoeveelheid werkzame stof.

De totale hoeveelheid bentoniet mag de maximaal toegestane hoeveelheid in volledig diervoeder van 20 000 mg/kg niet overschrijden.

INTERACTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN: Gelijktijdig gebruik met drinkwater waarin cholinechloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Bewaren op een koele, droge plaats (rond 25°C) in de originele verpakking. Na opening de verpakking goed gesloten houden. Bij voorkeur te gebruiken vóór: zie verpakking.

Gefabriceerd door: aESP28041411
Gegarandeerd volgens GMP+ FSA

EspermaPlus®



FR ALIMENT COMPLÉMENTAIRE MINÉRAL pour l'alimentation des verrats

COMPOSANTS: Carbonate de calcium, Phosphate monocalcique, Dextrose, Sel sodique de l'acide butyrique, Levures inactivées, Algues sèches.

COMPOSANTS ANALYTIQUES: CALCIUM 13,7 % ; SODIUM 1,7 % ; PHOSPHORUS 4,2 % ; LYSINE 4,17 % ; MÉTHIONINE 5,56 %.

ADDITIFS (composition pour 1 kg): VITAMINES, PROVITAMINES ET SUBSTANCES CHIMIQUEMENT DÉFINIES AYANT UN EFFET ANALOGUE: Vitamine A (3a672a) 560 000 UI ; Vitamine D3 (3a671) 15 000 UI ; Vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) (3a700) 9 445 mg ; Vitamine K3 (3a710) 85 mg ; Vitamine C (3a300) 8 336 mg ; Vitamine B1 (3a821) 80 mg ; Vitamine B2 (3a825ii) 336 mg ; Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) (3a831) 70 mg ; Vitamine B12 (3a835) 1,3 mg ; Niacine (3a314) 1 250 mg ; D-pantothénate de calcium (3a841) 560 mg ; Acide folique (3a316) 123 mg ; Chlorure de choline (3a890) 22 220 mg ; Bétaine HCl (3a925) 13 885 mg ; L-Carnitine (3a910) 7 225 mg.

COMPOSÉS D'OLIGO-ÉLÉMENTS*: Sulfate ferreux (II) monohydraté (3b103) 560 mg ; Iodure de potassium (3b201) 14 mg ; Chélate de cuivre (II) avec la glycine, hydraté solide (3b413) 290 mg ; Chélate de manganèse d'hydrate de glycine (3b506) 550 mg ; Chélate de zinc d'hydrate de glycine (solide) (3b607) 830 mg ; Sélénométhionine (Sacch. cerevisiae) (3b8.11) 6,7 mg.

ACIDES AMINÉS, LEURS SELS ET ANALOGUES: Lysine / Monochlorhydrate de L-lysine, techniquement pur (3.2.3) 51 960 mg ; DL-Méthionine (3c301) 56 000 mg ; L-Thréonine (3c410) 32 160 mg ; L-Tryptophane (3c440) 8 400 mg.

CONSERVATEURS: Acide citrique (1a330) 166,5 mg.

ANTIOXYDANTS: Butylhydroxytoluène (BHT) (E321) 166,5 mg ; Gallate de propyle (E310) 166,5 mg.

ANTIAGGLOMÉRANTS: Sépiolite (E562) 100 g ; Acide silicique précipité et séché (E551a) 4,9 g.

RÉDUCTEURS DE LA CONTAMINATION DES ALIMENTS POUR ANIMAUX PAR LES MYCOTOXINES: Aflatoxine B1 Bentonite (1m558) : ≥ 70 % smectite (montmorillonite dioctaédrique) 75 000 mg.

AROMATISANTS: Mélange d'aromatizants 18 000 mg.

MODE D'EMPLOI: 90 g par animal et par jour ou administré dans les aliments à raison de 30 kg/tonne.

* La teneur en oligoéléments est exprimée en quantité de substance active. La quantité totale de bentonite ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée dans l'aliment complet de 20 000 mg/kg

INTERACTIONS ET INCOMPATIBILITÉS

L'utilisation simultanée avec de l'eau potable dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté doit être évitée

CONSERVATION : Conserver dans un endroit frais et sec (environ 25 °C) et dans son emballage d'origine. Une fois ouvert, maintenir l'emballage bien fermé. À utiliser de préférence avant : voir l'emballage.

NL MINERAAL AANVULLEND VOEDER bestemd voor beren

SAMENSTELLING: Calciumcarbonaat, Monocalciumfosfaat, Dextrose, Natriumzout van boterzuur, Gedeactiveerde gisten, Gedroogde algen.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: CALCIUM 13,7%; NATRIUM 1,7%; FOSFOR 4,2%; LYSINE 4,17%; METHIONINE 5,56%.

ADDITIEVEN SAMENSTELLING PER 1 KG: VITAMINEN, PROVITAMINEN EN CHEMICALLY WELL-DEFINED SUBSTANCES MET EEN GELIJKSOORTIG EFFECT: Vitamine A (3a672a) 560.000 IE; Vitamine D3 (3a671) 15.000 IE; Vitamine E (DL-alfa-tocoferolacetaat) (3a700) 9.445 mg; Vitamine K3 (3a710) 85 mg; Vitamine C (3a300) 8.336 mg; Vitamine B1 (3a821) 80 mg; Vitamine B2 (3a825ii) 336 mg; Vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride) (3a831) 70 mg; Vitamine B12 (3a835) 1,3 mg; Niacine (3a314) 1.250 mg; D-calciumpantotenaat (3a841) 560 mg; Foliumzuur (3a316) 123 mg; Cholinechloride (3a890) 22.220 mg; Betaine HCl (3a925) 13.885 mg; L-Carnitine (3a910) 7.225 mg.

SPOORELEMENTVERBINDINGEN*: Ijzersulfaat (II) monohydraat (3b103) 560 mg; Kaliumjodide (3b201) 14 mg; Koper(II)glycinaat, gehydrateerd, vast (3b413) 290 mg; Mangaan(glycinaat)hydraat (3b506) 550 mg; Zink(glycinaat)hydraat, vast (3b607) 830 mg; Selenomethionine (Sacch. Cerevisiae) (3b8.11) 6,7 mg.

AMINOZUREN, HUN ZOUTEN EN ANALOGEN: Lysine / L-lysine-monohydrochloride, technisch zuiver (3.2.3) 51.960 mg; DL-Methionine (3c301) 56.000 mg; L-Threonine (3c410) 32.160 mg; L-Tryptofaan (3c440) 8.400 mg.

CONSERVERINGSMIDDELEN: Citroenzuur (1a330) 166,5 mg.

ANTIOXIDANTEN: Butylhydroxytoluëen (BHT) (E321) 166,5 mg; Propylgallaat (E310) 166,5 mg.

ANTIKLONPMIDDELEN: Sepioliet (E562) 100 g; Neergeslagen en gedroogd kiezelzuur (E551a) 4,9 g.

REDUCTIEMIDDELEN VAN MYCOTOXINEBESMETTING IN DIERVOEDER: Aflatoxine B1 Bentoniet (1m558): ≥ 70% smectiet (dioctaëdrische montmorilloniet) 75.000 mg.

AROMATISCHE STOFFEN: Mengsel van aromatische stoffen 18.000 mg.

GEbruiksaanwijzing: 90 g per dier per dag of toegediend via het voeder in een hoeveelheid van 30 kg per ton.

* Het gehalte aan sporenelementen wordt uitgedrukt als de hoeveelheid werkzame stof.

De totale hoeveelheid bentoniet mag de maximaal toegestane hoeveelheid in volledig diervoeder van 20 000 mg/kg niet overschrijden.

INTERACTIES EN ONVERENIGBAARHEDEN: Gelijktijdig gebruik met drinkwater waarin cholinechloride is toegevoegd, moet worden vermeden.

Bewaren op een koele, droge plaats (rond 25°C) in de originele verpakking. Na opening de verpakking goed gesloten houden. Bij voorkeur te gebruiken vóór: zie verpakking.

Gefabriceerd door: aESP28041411
Gegarandeerd volgens GMP+ FSA