Deltasect

Insecticide à utiliser contre les insectes rampants. Insecticide concentré en suspension. DELTASECT peut être utilisé dans les fissures et les joints. Ce produit agit contre les insectes rampants tels que les cafards, les fourmis et les insectes rampants à l'intérieur.
DELTASECT convient au contrôle des insectes rampants dans des domaines tels que les maisons, les appartements, les centres commerciaux, les cinémas, les hôtels, les restaurants, les bars, les cantines, les hôpitaux, les entrepôts industriels.

Composition et formulation

Le produit est un concentré de suspension, à base de 2,394% de deltaméthrine. La deltaméthrine est un pyréthroïde synthétique qui a un effet neurotoxique (toxique pour le système nerveux du ravageur) sur les insectes lorsqu'il est touché ou inhalé. Les pyréthroïdes provoquent des impulsions nerveuses répétitives en gardant les canaux ioniques sodiques ouverts. En conséquence, les insectes qui entrent en contact avec DELTASECT meurent en quelques minutes à quelques heures.
SC – concentré de suspension.

Applications

Insecticide concentré en suspension à utiliser dans les fissures et les joints contre les insectes rampants tels que les cafards et les fourmis.
Utilisation en intérieur, avec pulvérisateur basse pression (pulvérisateur à main et pulvérisateur à dos).
50 ml de produit dans 5 L d'eau pour 100 m^2 de surface - (1% / 1:100).
Maximum 6-8 applications par an. L'application peut être répétée après 2 mois.

Toxicologie et recommandations

Appliquer DELTASECT à l'aide d'une pompe ou d'un pulvérisateur. Appliquer uniquement dans les fissures et les joints.

Diluez le produit dans l'eau dans un rapport de 1:100. Vaporisez la solution résultante dans un dosage de 1 litre de solution d'utilisation par 20 m^2. Appliquer la solution d'utilisation à l'aide d'un pulvérisateur basse pression (pulvérisateur à main ou à dos).

Appliquer avec une largeur de pulvérisation maximale de 0,1 m sur les surfaces traitées.

Lors de la vidange, ENTIERREMENT RINCER L'EMBALLAGE à l'aide d'un dispositif de rinçage intégré sous pression ou rinçage manuel trois fois. Utilisez un nettoyant pour pulvérisateur. Évitez d'évacuer cette eau de rinçage à l'égout. Le produit n'est pas destiné à être utilisé dans des zones où les animaux sont hébergés. Par conséquent, l'exposition aux animaux n'est pas prévue.

Utiliser uniquement comme insecticide. Usage intérieur uniquement.

Lavez-vous les mains et la peau directement exposée après avoir manipulé le produit avant de manger, de boire et de fumer. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques et produits.

Évitez tout contact avec les surfaces traitées. Ne pas utiliser en présence de personnes (en particulier des enfants) et d'animaux de compagnie ou d'animaux. Ne conservez jamais la solution de pulvérisation reconstituée. Préparez une nouvelle solution de pulvérisation avant chaque utilisation.

Tenir à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Retirez les aliments et les aliments pour animaux avant le traitement. Tenir à l'écart des objets pouvant entrer en contact avec des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Couvrir les réservoirs de stockage d'eau, les surfaces de préparation des aliments, l'équipement de préparation des aliments et les couverts avec du plastique imperméable avant le traitement.

Les zones traitées peuvent être réintroduites par les humains, les animaux domestiques et d'autres animaux dès que les surfaces traitées sont à nouveau sèches.

Gestion de la résistance:

La deltaméthrine est utilisée dans les biocides pendant une période de temps limitée et ne devrait donc pas contribuer au développement d'une résistance chez les organismes cibles. Pour éviter le développement d'une résistance chez les organismes cibles, il est recommandé d'alterner l'utilisation de produits contenant de la deltaméthrine avec d'autres insecticides qui ne contiennent pas de pyréthrinoïdes.

Consultez toujours la FDS.

UTILISATION PROFESSIONNELLE ET NON PROFESSIONNELLE

ORGANISMES CIBLES

Insectes rampants

HOMOLOGATIONS

BE : BE2018-0017

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans dans un emballage fermé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Réduisez le risque de résistance en alternant avec des substances actives.

CONDITIONNEMENTS

Flacon doseur 500 ml

MAJMR050922

ARMOSA SA/NV
1, rue des Tuiliers
B-4480 Hermalle-sous-Huy
T. +32(0)85 519 519
M. info-be@armosa.eu
W. www.armosa.eu

ARMOSA