



Dietetic complementary feed for poultry and pigs

Diät-Ergänzungsfuttermittel für Geflügel und Schweine

USE:

Support in cases of nutritional imbalances during feed transitions, such as changes in diet, by-products or batches.

Dosage: 0.1 litre to 0.5 litre of ZINVIO per 1,000 litres of drinking water.

This dietetic feed must not account for more than 0.18% of the daily ration of poultry and pigs.

When determining the dosage, the zinc content of the other feed must be taken into account.

The simultaneous use of different organic acids or their salts is contraindicated when the maximum level for one or more of these substances has been reached or is nearly reached.

Before using the product or extending the period of use, a veterinarian or a nutritionist should be consulted.

Period of use: 2 to 15 days.

Storage: Store in a cool place (5–25 °C) and protect from direct sunlight.

COMPOSITION:

Glycerine, propylene glycol.

Additives per kg:

Nutritional additives:

3b608 zinc chelate of glycine, hydrated (Zn: 60.000.07 mg/kg).

3b414 copper chelate of glycine, hydrated (Cu: 200 mg/kg).

Technological additives:

Lactic acid (1a270): 666 mg/kg.

propionic acid (1k280): 833 mg/L.

Analytical constituents:

Crude protein: 0%, Crude ash: 0%, Crude fibre: 0%, Crude fat: 0%, Lysine: 0.4%,

Methionine: 0.2%, Sodium: 0%, Moisture: 75%

DANGER WARNING:

Precautionary statements:

P102 Keep out of reach of children.

P280 Wear eye protection.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.

Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 Immediately call a POISON CENTER or doctor.

P391 Collect spillage.

P501 Dispose of contents/container by handing it over to an authorised person for waste handling or return it to the supplier.

VERWENDUNG :

Unterstützung bei Ernährungsungleichgewichten während einer Futterumstellung, wie beispielsweise bei Änderungen der Futterration, der Nebenprodukte oder der Charge.

Dosierung: 0,1 Liter bis 0,5 Liter ZINVIO je 1.000 Liter Trinkwasser.

Dieses Diät-Ergänzungsfuttermittel darf nicht mehr als 0,18 % der Tagesration von Geflügel und Schweinen ausmachen.

Bei der Dosierung ist der Zinkgehalt des sonstigen Futters zu berücksichtigen.

Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn der Höchstgehalt für einen oder mehrere dieser Stoffe erreicht oder nahezu erreicht ist.

Vor der Verwendung des Produkts oder einer Verlängerung der Anwendungsdauer sollte ein Tierarzt oder Ernährungsberater konsultiert werden.

Anwendungsdauer: 2 bis 15 Tage.

Lagerung: Kühl (5–25 °C) und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

ZUSAMMENSETZUNG :

Glycerin, Propylenglykol.

Zusatzstoffe je kg:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

3b608 Zinkchelate von Glycin, hydratisiert (Zn: 60.000,07 mg/kg).

3b414 Kupferchelate von Glycin, hydratisiert (Cu: 200 mg/kg).

Technologische Zusatzstoffe:

Milchsäure (1a270): 666 mg/kg.

Propionsäure (1k280): 833 mg/L.

Analytische Bestandteile:

Rohprotein: 0 %, Rohasche: 0 %, Rohfaser: 0 %, Rohfett: 0 %, Lysin: 0,4 %,

Methionin: 0,2 %, Natrium: 0 %, Feuchtigkeit: 75 %

GEFAHR / WARNUNG:

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behälter einer zugelassenen Person zur Abfallbehandlung zuführen oder an den Lieferanten zurücksenden.



UN3082

environmentally hazardous
substance, liquid, N.O.S.
(zinc glycinate)

Batch Nr.

Prod. Date

Exp. Date



A04202