



Aanvullende dietvoeder
voor pluimvee en varkens

Aliment complémentaire
diététique pour volailles et porcs

GEBRUIK:

Ondersteuning bij voedingsonevenwichtigheden tijdens voedingstransitie, zoals verandering in dieet, bijproducten of batch.

Dosering: 0,1 liter tot 0,5 liter ZINVIO per 1000 liter drinkwater.

Dit dietvoeder mag niet meer dan 0,18% van het dagrantsoen van pluimvee en varkens uitmaken.

Bij de dosering dient men rekening te houden met het gehalte zink in het overige voeder.

Het gelijktijdige gebruik van verschillende organische zuren of hun zouten is gecontra-indiceerd wanneer het maximumgehalte voor één of meer van deze stoffen bereikt of bijna bereikt is.

Voor het gebruik van het product of verlenging van de toepassing moet een dierenarts of een voedingsdeskundige worden geraadpleegd.

Gebruiksperiode: 2 tot 15 dagen.

Bewaren: koel (5-25°C) en uit direct zonlicht.

SAMENSTELLING:

Glycerine, propyleenglycol

Toevoegingsmiddelen per kg:

Nutritionele toevoegingsmiddelen

3b608 zinkchelaat van glycine gehydrateerd (Zn: 60000,07 mg/kg),

3b414 koperchelaat van glycine gehydrateerd (Cu: 200mg/kg)

Technologische toevoegingsmiddelen

Melkzuur (1a270): 666 mg/kg, propionzuur (1k280): 833 mg/L

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit 0 %, ruwe as 0 %, ruwe celstof 0 %, ruw vet 0 %, lysine 0,4 %, methionine 0,2 %, natrium 0 %, vocht 75 %

GEVAAR/ WAARSCHUWING:

Veiligheidsaanbevelingen:

P 102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P 280 Oogbescherming dragen.

P 305+P351+P338 BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P 391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar door inleveren bij een bevoegde persoon voor hantering van afval of retourneren aan de leverancier.

UTILISATION :

Soutien en cas de déséquilibres nutritionnels lors d'une transition alimentaire, tels qu'un changement de régime alimentaire, de sous-produits ou de lot.

Dosage : 0,1 litre à 0,5 litre de ZINVIO par 1 000 litres d'eau de boisson.

Cet aliment complémentaire ne doit pas représenter plus de 0,18 % de la ration journalière des volailles et des porcs.

Lors du dosage, il convient de tenir compte de la teneur en zinc des autres aliments.

L'utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsque la teneur maximale autorisée pour une ou plusieurs de ces substances est atteinte ou presque atteinte.

Avant l'utilisation du produit ou la prolongation de la période d'utilisation, il convient de consulter un vétérinaire ou un nutritionniste.

Période d'utilisation : 2 à 15 jours.

Conservation : conserver au frais (5–25 °C) et à l'abri de la lumière directe du soleil.

COMPOSITION :

Glycérine, propylène glycol.

Additifs par kg :

Additifs nutritionnels :

3b608 chélate de zinc de glycine hydraté (Zn : 60 000,07 mg/kg),

3b414 chélate de cuivre de glycine hydraté (Cu : 200 mg/kg).

Additifs technologiques :

Acide lactique (1a270) : 666 mg/kg,

acide propionique (1k280) : 833 mg/L.

Constituants analytiques :

Protéines brutes : 0 %, Cendres brutes : 0 %, Cellulose brute : 0 %, Matières grasses brutes : 0 %, Lysine : 0,4 %, Méthionine : 0,2 %, Sodium : 0 %, Humidité : 75 %

DANGER/ AVERTISSEMENT:

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter une protection oculaire.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P391 Recueillir le produit répandu.

P501 Éliminer le contenu/récipient en le remettant à une personne habilitée à la gestion des déchets ou le retourner au fournisseur.



UN3082

environmentally hazardous
substance, liquid, N.O.S.
(zinc glycinate)

Batch Nr.

Prod. Date

Exp. Date



A04202